

Caracterización de las manifestaciones oftalmológicas en pacientes con Lupus eritematoso sistémico. Hospital Clínico Quirúrgico. 2019-2020

Autores. Dra. Mabel Silva Jiménez

MSc.Dra. Liliana Paz Torres

Hospital Clínico Quirúrgico " Lucía Iñiguez Landín " Holguín

INTRODUCCIÓN. Se identificó un retraso importante entre el diagnóstico inicial y la primera valoración oftalmológica de los pacientes con Lupus eritematoso sistémico. Este hecho representa un aspecto preocupante y de suma importancia porque las manifestaciones oculares pueden ser el único signo de actividad inflamatoria y muchas veces pasan desapercibida al reumatólogo.

MÉTODO

Clasificación y contexto.

Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y de serie de casos para de caracterizar las principales manifestaciones oftalmológicas diagnosticadas en los pacientes con Lupus eritematoso sistémico atendidos en el servicio de Reumatología del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín de Holguín en el período comprendido entre enero 2019 a diciembre 2020

Población y muestra.

El universo de estudio se constituyó por 57 pacientes con clínica de Lupus eritematoso sistémico que acudieron a la consulta externa del servicio de Reumatología en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín de Holguín, en el período de enero 2019 a diciembre 2020. Mediante un muestreo intencional se conformó la muestra, representada por 50 pacientes diagnosticados con Lupus eritematoso sistémico con manifestaciones oftalmológicas, acorde a los criterios de inclusión, exclusión y de salida.

CONCLUSIONES

El grupo de edad más representado fue el de 30-39 años y sexo femenino.

La manifestación oftalmológica más frecuente fue queratoconjuntivitis sicca y como tiempo de evolución de la enfermedad +10 años.

El efecto ocular adverso relacionado al tratamiento mostró su mayor predominio en catarata subcapsular posterior por esteroides. las manifestaciones oftalmológicas de los pacientes con diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico encontradas en la investigación son actividad inflamatoria asociada a la enfermedad.

RESULTADOS

Gráfico 1 Distribución de pacientes según sexo y edad.




Gráfico 2 Distribución de pacientes según manifestaciones oftalmológicas más frecuentes




Gráfico 3. Distribución de pacientes con Lupus eritematoso sistémico, según efectos oculares adversos relacionados al tratamiento.




Gráfico 4. Distribución de pacientes con Lupus eritematoso sistémico, según alteraciones oculares al fondo de ojo.

