

PRINCIPALES MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE EN HOLGUÍN 2019-2021

Autores. Dra. Raisa B Bermúdez Pérez

Dra. Liliana Torres Pérez

Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Iñiguez Landín" Holguín

INTRODUCCIÓN. Las enfermedades reumáticas tienen manifestaciones a todos los niveles del organismo. La Artritis Reumatoide es una de ellas, que presenta manifestaciones articulares y extraarticulares dentro de estas últimas se encuentran las oculares

MÉTODO

Clasificación y contexto.

Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal en el Hospital Clínico Quirúrgico "Lucía Iñiguez Landín" de la provincia de Holguín para caracterizar las principales manifestaciones oftalmológicas en pacientes con artritis reumatoide en el periodo 2019-2021.

Población y muestra.

El estudio se realiza sobre una población de 186 pacientes con artritis reumatoide atendidos en la consulta externa del servicio de Reumatología del Hospital Clínico Quirúrgico que refieran manifestaciones oculares.

Datos generales

N	% error	Nivel confianza	Z	d	p	q
186	5	95 %	1.96	0.05	0.6	0.4

$$n = \frac{N Z^2 pq}{d^2 (N-1) + Z^2 pq} = \frac{186 \cdot 1.96^2 \cdot 0.6 \cdot 0.4}{0.05^2 (186-1) + 1.96^2 \cdot 0.6 \cdot 0.4} = 123 \text{ pacientes}$$

La muestra está compuesta por 123 pacientes seleccionados con artritis reumatoide atendidos en la consulta externa del servicio de Reumatología del Hospital Clínico Quirúrgico que refieran manifestaciones oculares, siguiendo un muestreo aleatorio simple.

CONCLUSIONES

La manifestación oftalmológica más frecuente en los pacientes con AR es la QCS. Su incidencia es mayor en el sexo femenino y en el rango comprendido entre 51 y 59 años como promedio.

Se asocian con más frecuencia a un FR positivo. Aparece generalmente con más de 10 años de evolución de la enfermedad.

El tratamiento precoz, tras un acertado diagnóstico de las afecciones oculares, contribuye a mejorar el pronóstico visual del paciente.

RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de los pacientes según las manifestaciones oftalmológicas. Holguín, 2019-2021

Manifestaciones	Cantidad Pacientes	Porcentaje %
Queratoconjuntivitis sicca	56	45.5%
Escleritis	5	4.0 %
Epi escleritis.	6	5.5 %
Iridociclitis.	0	-
Úlcera corneal	5	4.0%
Glaucoma	9	7.3%
Catarata subcapsular	28	22.4%
Disminución de la agudeza visual	14	11.3%

Gráfico 1 Distribución de pacientes según edad y sexo.




Tabla 5. Principales síntomas y signos en los pacientes con manifestaciones oftalmológicas. Holguín 2019-2021

Síntomas y signos	Cantidad de pacientes	Porcentaje %
Dolor ocular	33	26.8
Sensación de arenilla	50	40.7
Ojo rojo	5	4.1
Resequos ocular	35	28.5
Fotofobia	22	17.9
Disminución de la agudeza visual	28	22.8
Inflamación ocular	6	4.9
Visión borrosa	12	9.8

Gráfico 2. Relación entre los medicamentos utilizados y las principales manifestaciones derivadas de su uso

